

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 17 din 19.05.2025**TRATAMENT PENTRU COMBATAREA DĂUNĂTORILOR LA CEAPĂ, USTUROI ȘI PRAZ**


Pentru combaterea **dăunătorilor** care pot produce atac în **culturile de legume bulboase**, se recomandă efectuarea unui tratament fitosanitar.

Musca cepei (*Hylemia antiqua*) - are două generații pe an și ierneză în stadiul de pupă în sol. Atacul este produs de larve care atacă frunzele și bulbii în curs de formare, iar în galeriile săpate de larve se instalează ciuperci și bacterii care accelerează putrezirea. Plantele atacate au frunzele îngălbenite, se vestejesc, apoi se usucă, formarea bulbilor este încetinită, iar cei formați rămân mici și putrezesc.

Musca usturoiului (*Suillia lurida*) - are o generație pe an, ierneză în stadiul de adult . Atacul este produs de larve care se localizează la început în zona coletului, după care pătrund în bulb unde sapă galerii. Atacul poate fi identificat după frunza centrală care se îngălbeneste și se usucă, plantele atacate se opresc din creștere iar bulbii putrezesc.

Tripsul comun (*Trips tabaci*) - dăunător frecvent întâlnit în cultura de ceapă, mai ales în anii secetoși. Plantele atacate se opresc din creștere, frunzele sunt lipsite de turgescență, iar cultura are culoare argintie. Are în general 3- 6 generații pe an. Tripsul comun este vector de viroze - la ceapă - dungarea galbenă a frunzelor.

ALȚI DĂUNĂTORI ce pot apărea în cultura de ceapa: Gărgărița cepei (*Ceuthorrhynchus suturalis*), Gândacul roșu (*Lilioceris merdigera*), Molia miniera a frunzelor (*Liriomyza cepae*), Păduchele verde al cepei (*Myzus ascalonicus*)



musca cepei



atac musca usturoiului



tripsul comun



atac molia miniera

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare, utilizand unul din produsele, după caz:

BENEVIA - 0,75 l/ha - omologat pentru musca cepei și a usturoiului sau

KARATE ZEON (NINJA) - 0,02% (0,16 l/ha) - produs omologat pentru combaterea tripsului comun. sau

MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) - 0,2 kg/ha - produs omologate pentru combaterea tripsului comun. sau

DELTAM- 5 - 8 ml/10 litri de apă - omologat pentru combaterea moliilor miniere și a afidelor la ceapă și usturoi și a omizilor defoliatoare la praz.

Pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la legumele bulboase, pot fi utilizate și alte produse omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României, produse cuprinse în baza de date PEST-EXPERT (user name: guest ; parola: guest)
Se va respecta cu strictețe timpul de pauză indicat pe ambalajul produsului utilizat.

MOMENTUL APLICĂRII TRATAMENTULUI

Tratamentul se va aplica la formarea primelor frunze, la apariția în masă a adulților hibernanți de musca cepei și a usturoiului. În caz de atac puternic , tratamentul se va repeta la interval de 10 -12 zile, alternând produsele.

În cazul celorlalți dăunători, tratamentul se va efectua la depistarea acestora în cultură.

Pentru combaterea dăunătorilor musca cepei și musca usturoiului, se recomandă stropirea plantelor, astfel încât soluția să ajungă până în zona coletului, zona afectată de dăunatori.

Pentru eficiența tratamentului, se va adăuga în soluția de stropit un adjuvant care să permită o aderență mai bună la frunzele lucioase, dispersie corespunzătoare și care mărește rezistența la spălare a suprafețelor tratate. Se poate utiliza **SILWET** sau **SPRAY GARD** sau **BREAKTHRU**. **Ceapa destinată consumului în stare verde nu se tratează.**

METODE DURABILE: metode biologice, biotehnice, fizice, mecanice și alte metode nechimice, trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al agenților de dăunare; (strategii și tehnici de gestionare integrată a dăunătorilor, principii ale agriculturii ecologice)

Pentru reducerea rezervei biologice se recomandă **măsuri agrotehnice și de igienă culturală:** rotația culturilor, strângerea și distrugerea resturilor vegetale după recoltare, plantarea cepei cât mai timpuriu. În zonele infestate, culturile se vor amplasa pe teren cu Ph ridicat.

ALTE RECOMANDĂRI:

- ◆ Pentru a evita apariția raselor rezistente de boli și dăunatori la un anumit produs, folosiți pentru tratamentele dintr-un sezon, produse din grupe chimice diferite.
- ◆ Nu se efectuează tratamente fitosanitare la viteze ale vântului mai mari de 4 m/s.
- ◆ La realizarea amestecurilor se va verifica, cu mare atenție, compatibilitatea produselor utilizate.
- ◆ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
- ◆ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu : Legea apiculturii 383 /2013, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; precum și cu Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu PPP.
- ◆ Respectați prevederile Ord.nr. 297/2017 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. (www.anfd.ro)
- ◆ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare .
- ◆ Respectați măsurile obligatorii privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în **adresa de informare nr. 116 din 04.02.2025 a Oficiului Fitosanitar Suceava.**
- ◆ Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, **pe platforma FITS** <https://fits.anfd.ro>
- ◆ Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente.
- ◆ Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați. Eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza, timpul de pauză, modul de aplicare. etc

Intocmit
ing. Platon Maria